



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
Escola de Engenharia de Lorena – EEL

# ENGENHARIA FÍSICA

## Fenômenos de Transporte A (Mecânica dos Fluidos)

Prof. Dr. Sérgio R. Montoro  
[sergio.montoro@usp.br](mailto:sergio.montoro@usp.br)

[srmontoro@dequi.eel.usp.br](mailto:srmontoro@dequi.eel.usp.br)



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
Escola de Engenharia de Lorena – EEL

# MECÂNICA DOS FLUIDOS

# ENGENHARIA FÍSICA

AULA 4

EQUAÇÃO MANOMÉTRICA

EXERCÍCIOS



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**Escola de Engenharia de Lorena – EEL**

# **EQUAÇÃO MANOMÉTRICA**




## **EQUAÇÃO MANOMÉTRICA**

É a expressão que permite, por meio de um manômetro, determinar a pressão de um reservatório ou a diferença de pressão entre dois reservatórios.

Seja o manômetro da figura a seguir. Pode-se calcular a pressão no fundo dos dois ramos. Pelo teorema de Stevin, e lembrando que, segundo Pascal, a pressão se transmite integralmente a todos os pontos do fluido, tem-se:



## EQUAÇÃO MANOMÉTRICA



Pressão no fundo do ramo esquerdo:

$$p_{fe} = p_A + \gamma_A (h_1 - h_2) + \gamma_M h_2$$

Pressão no fundo do ramo direito:

$$p_{fd} = p_B + \gamma_B (h_4 - h_3) + \gamma_M h_3$$



## EQUAÇÃO MANOMÉTRICA

Como o fluido está em equilíbrio, então a pressão no mesmo nível deve ser a mesma.

Logo,

$$p_{fe} = p_{fd}$$

Portanto,

$$p_A + \gamma_A (h_1 - h_2) + \gamma_M h_2 = p_B + \gamma_B (h_4 - h_3) + \gamma_M h_3$$

Ou,

$$p_B = p_A + \gamma_A (h_1 - h_2) - \gamma_B (h_4 - h_3) - \gamma_M (h_3 - h_2)$$



## **EQUAÇÃO MANOMÉTRICA**

Nota-se que cada peso específico aparece multiplicado pela respectiva altura da coluna, sem necessidade de adotar como referência o fundo.


Baseada nessa observação, será mostrada uma regra prática e de fácil aplicação.



## EQUAÇÃO MANOMÉTRICA

**REGRA** ⇒ Começando do lado esquerdo, soma-se à pressão  $p_A$  a pressão das colunas descendentes e subtrai-se aquela das colunas ascendentes. Note-se que as cotas são sempre dadas até a superfície de separação de dois fluidos do manômetro. Tem-se, portanto:

$$p_A + \gamma_1 h_1 + \gamma_2 h_2 - \gamma_3 h_3 + \gamma_4 h_4 - \gamma_5 h_5 - \gamma_6 h_6 = p_B$$






## EQUAÇÃO MANOMÉTRICA

### EXEMPLO:

Dado o esquema da figura:

- 1- Qual é a leitura no manômetro metálico?
- 2- Qual é a força que age sobre o topo do reservatório?





**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**Escola de Engenharia de Lorena – EEL**

# **EXERCÍCIOS**



## **EXERCÍCIOS**

**1-** Qual é a altura da coluna de mercúrio ( $\gamma_{\text{Hg}} = 136.000 \text{ N/m}^3$ ) que irá produzir na base a mesma pressão de uma coluna de água de 5 m de altura? ( $\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 10.000 \text{ N/m}^3$ ) (Resp.:  $h_{\text{Hg}} = 368 \text{ mm}$ )

**2-** Determinar a pressão de 3,5 atm nas outras unidades de pressão na escala efetiva e, sendo a pressão atmosférica local 740 mmHg, determinar a pressão absoluta em todas as unidades de pressão.



## EXERCÍCIOS

### 2- Resolução:

$$1\text{atm} \rightarrow 760\text{mmHg}$$

$$3,5\text{atm} \rightarrow p$$

$$p = \frac{760 \times 3,5}{1} = 2660\text{mmHg}$$

$$p = \gamma_{\text{Hg}} h_{\text{Hg}} = 13.600 \times 2,66 = 36.200 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2} \times 9,8 \times 10^{-6} = 0,355\text{MPa}$$

$$p = 36.200 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2} \times 10^{-4} = 3,62 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \times 0,98 = 3,55\text{bar}$$

$$h_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{p}{\gamma_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{36.200}{1.000} = 36,2\text{mca}$$

$$p_{\text{atm}} = \gamma_{\text{Hg}} h_{\text{Hg}} = 13.600 \times 0,74 \cong 10.000 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2} = 1 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cong 9,8 \times 10^4 \text{Pa} = 0,098\text{MPa} = 0,97\text{atm} = 10\text{mca}$$


$$p_{\text{abs}} = 4,47\text{atm(abs)} = 46.200 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}(\text{abs}) = 0,453\text{MPa(abs)} = 4,62 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}(\text{abs}) = 3400\text{mmHg(abs)}$$



## EXERCÍCIOS

3- No manômetro da figura, o fluido A é água e o fluido B, mercúrio. Qual é a pressão  $p_1$ ? Dados:  $\gamma_{\text{Hg}} = 136.000 \text{ N/m}^3$ ;  $\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 10.000 \text{ N/m}^3$

Resp.:  $p_1 = 13,35 \text{ kPa}$






## EXERCÍCIOS

**4-** No manômetro diferencial da figura, o fluido A é água, B é óleo e o fluido manométrico é mercúrio. Sendo  $h_1 = 25$  cm,  $h_2 = 100$  cm,  $h_3 = 80$  cm e  $h_4 = 10$  cm, qual é a diferença de pressão  $p_A - p_B$ ? Dados:  $\gamma_{Hg} = 136.000 \text{ N/m}^3$ ;  $\gamma_{H2O} = 10.000 \text{ N/m}^3$ ;  $\gamma_{óleo} = 8.000 \text{ N/m}^3$

Resp.:  $p_A - p_B = -132,1 \text{ kPa}$






## EXERCÍCIOS

5- Calcular a leitura do manômetro A da figura.  $\gamma_{Hg} = 136.000 \text{ N/m}^3$


Resp.:  $p_M = 79,6 \text{ kPa}$





## EXERCÍCIOS

- 6- Determinar as pressões efetivas e absolutas do ar e no ponto M, na configuração a seguir. Dados: leitura barométrica 740 mmHg;  $\gamma_{\text{óleo}} = 8.500 \text{ N/m}^3$ ;  $\gamma_{\text{Hg}} = 136.000 \text{ N/m}^3$  (Resp.:  $p_{\text{ar}} = 34 \text{ kPa}$ ;  $p_{\text{par(abs)}} = 134 \text{ kPa}(\text{abs})$ ;  $p_M = 36,55 \text{ kPa}$ ;  $p_{M(\text{abs})} = 136,55 \text{ kPa}(\text{abs})$ )





## EXERCÍCIOS

7- No dispositivo da figura, a leitura do manômetro é 30 kPa e a relação de áreas dos pistões é  $A_2/A_1 = 2$ .

A pressão atmosférica no local é 700 mmHg. Estando o sistema em equilíbrio, pede-se a pressão  $p_B$  na escala absoluta em mca. Dados:

$$\gamma_{ar} = 27.000 \text{ N/m}^3; a = 100 \text{ cm}; b = 80 \text{ cm}; \gamma_{Hg} = 136.000 \text{ N/m}^3;$$


$$\gamma_{H2O} = 10.000 \text{ N/m}^3; A_1/A_2 = 2; \alpha = 30^\circ.$$

Resp.:  $p_{B(abs)} = 171.200 \text{ Pa(abs)}$ ;  $h_{H2O} = 17,12 \text{ mca(abs)}$



## EXERCÍCIOS


Figura do exercício 7





## EXERCÍCIOS

8- Determinar  $\rho_A$ ,  $p_0$  e  $p_{0\text{ abs}}$  na configuração do desenho, sendo dados:  $h_B = 0,1\text{ m}$ ;  $h_A = 0,2\text{ m}$ ;  $\rho_B = 1.000\text{ kg/m}^3$ ;  $p_{\text{atm}} = 100\text{ kPa}$ ;  $g = 10\text{ m/s}^2$ .





## EXERCÍCIOS

### 8- Resolução:

$$p_0 + \rho_A gh_A = 0$$

$$p_0 + \rho_B gh_B = 0 \Rightarrow \rho_A h_A = \rho_B h_B \Rightarrow \rho_A = \rho_B \frac{h_B}{h_A} = 1.000 \times \frac{0,1}{0,2} = 500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$p_0 = -\rho_A gh_A = -500 \times 10 \times 0,2 = -1.000 \text{Pa} = -1 \text{kPa}$$

$$p_{0\text{abs}} = p_0 + p_{\text{atm}} = -1 + 100 = 99 \text{kPa (abs)}$$



## **EXERCÍCIOS**


**9-** No sistema da figura, na situação inicial a esfera está vazia. Introduz-se óleo pelo funil até preencher totalmente o recipiente esférico e y passar a valer  $y' = 1$  m. Dados:  $\gamma_{\text{óleo}} = 8.000 \text{ N/m}^3$ ;  $\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 10.000 \text{ N/m}^3$

- a-** Qual é o valor de y na situação inicial? (Resp.:  $y = 0,4 \text{ m}$ )
- b-** Qual é o diâmetro da esfera? (Resp.:  $D = 0,45 \text{ m}$ )
- c-** Qual é o volume de óleo introduzido para estabelecer a situação final?  
(Resp.:  $V = 47.833 \text{ cm}^3$ )



## EXERCÍCIOS

### Figura do exercício 9





## EXERCÍCIOS

**10-** A figura mostra o ar contido num recipiente, inicialmente a 100°C. O ar é esfriado e a água do manômetro sobe 0,5 cm para dentro do recipiente. Dados:  $p_{atm} = 100 \text{ kPa}$ ;  $\gamma_{H_2O} = 10.000 \text{ N/m}^3$ ;  $\gamma_{Hg} = 136.000 \text{ N/m}^3$

**a-** Qual é a leitura inicial do manômetro? (Pa) ([Resp.: 25.200 Pa](#))

**b-** Qual é a leitura final do manômetro? (Pa) ([Resp.: 12.050 Pa](#))

**c-** Qual é a temperatura final do ar? (°C) ([Resp.: 44°C](#))



## EXERCÍCIOS

### Figura do exercício 10

