4. O potencial químico de um gás ideal puro

Equação fundamental da energia livre de Gibbs:

$$dG = -S.dT + V.dP + \sum_i \mu_i . dn_i$$

Potencial químico de um componente em uma solução:

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_j}$$

Potencial químico de um gás ideal puro a T c^{te}:

$$\mu_i = \mu_i^o(T) + RT \ln p$$

A pressão é uma medida do potencial químico. Se houver diferença de pressão em um recipiente com gás, haverá escoamento de matéria da região de maior pressão (potencial químico maior) para a de menor pressão (potencial químico menor).

5. Potencial químico de um gás ideal em uma solução de gases ideais.

$$T = c^{te}$$

Fig. 11.1 Potencial químico de um gás numa mistura.

Condição de equilíbrio:

$$\mu_{H_2(puro)} = \mu_{H_2(solução)}$$

$$\mu_{H_2}^{\circ}(T) + RT \ln p_{H_2(puro)} = \mu_{H_2}^{\circ}(T) + RT \ln p_{H_2(solução)}$$

com $\mu_i^{\circ}(T)$ sendo o potencial químico do gás puro a 1 atm na temperatura T .

Aplicando a qualquer substância i ,

$$\mu_i = \mu_i^{\circ}(T) + RT \ln p_i$$

Usando a relação $p_i = x_i p$, onde x_i é a fração molar da substância i na solução e p a pressão total,

$$\mu_i = \mu_i^{\circ}(T) + RT \ln p + RT \ln x_i = \mu_{i(puro)}^{\circ}(T, p) + RT \ln x_i$$

5. Potencial químico de um gás ideal em uma solução de gases ideais.

$$\mu_i = \mu_{i(\text{puro})}(T, p) + RT \ln x_i$$

Se um gás puro sob pressão p for colocado em contato com uma solução sob a mesma pressão total, o gás puro escoará espontaneamente para a mistura. Esta é a interpretação termodinâmica do fato de que os gases, bem como líquidos e sólidos, difundem-se uns nos outros.

Generalizando para uma solução ideal em qualquer estado de agregação, temos

$$\mu_i = \mu_{i(\text{puro})}^{\circ}(T, p) + RT \ln x_i$$

onde $\mu_{i(\text{puro})}^{\circ}(T, p)$ é o potencial químico das espécies puras i no mesmo estado de agregação da mistura.

6. Energia livre de Gibbs e entropia do processo de mistura.

Fig. 11.2 Energia livre de um processo de mistura. (a) Estado inicial. (b) Estado final.

$$G_i = n_i \mu_i$$

$$\mu_i - \mu_{i(\text{puro})}^{\circ}(T, p) = RT \ln x_i$$

$$G_{\text{inicial}} = G_1 + G_2 + G_3 = n_1 \mu_1^{\circ} + n_2 \mu_2^{\circ} + n_3 \mu_3^{\circ} = \sum_i n_i \mu_i^{\circ}$$

$$G_{\text{final}} = n_1 \mu_1 + n_2 \mu_2 + n_3 \mu_3 = \sum_i n_i \mu_i$$

$$\Delta G_{\text{solução}} = n_1 (\mu_1 - \mu_1^{\circ}) + n_2 (\mu_2 - \mu_2^{\circ}) + n_3 (\mu_3 - \mu_3^{\circ})$$

$$\Delta G_{\text{solução}} = RT(n_1 \ln x_1 + n_2 \ln x_2 + n_3 \ln x_3) = RT \sum_i n_i \ln x_i$$

Com $n_i = x_i \cdot n$,

$$\Delta G_{\text{solução}} = nRT \sum_i x_i \ln x_i$$

6. Energia livre de Gibbs e entropia do processo de mistura.

$$\Delta G_{\text{solução}} = nRT \sum_i x_i \ln x_i$$

$$\left(\frac{\partial \Delta G_{\text{solução}}}{\partial T} \right)_{p, n_i} = - \Delta S_{\text{solução}}$$

$$\Delta S_{\text{solução}} = - nR \sum_i x_i \ln x_i$$

Numa solução binária

$$\Delta G_{\text{sol}} = nRT(x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2)$$

$$\Delta S_{\text{sol}} = - nR(x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2)$$

$$\Delta S_{\text{máx}} = - R(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}) = - R \ln \frac{1}{2} = 5,76 J / K.mol$$

6. Energia livre de Gibbs e entropia do processo de mistura.

Calor de solução (ideal)

$$\Delta G_{sol} = \Delta H_{sol} - T\Delta S_{sol}$$

$$nRT \sum_i x_i \ln x_i = \Delta H_{sol} + nRT \sum_i x_i \ln x_i$$

$$\Rightarrow \Delta H_{sol} = 0$$

Não há efeito de calor associado com o processo de mistura de gases ideais.

$$\Delta G_{sol} = -T\Delta S_{sol} \dots \dots (0 \dots - 1730 J / mol)$$

$$\Delta S_{\max} = 5,76 J / mol.K$$

$$T = 300 K$$

Volume do processo de solução (ideal)

$$\left(\frac{\partial \Delta G_{sol}}{\partial p} \right)_{T, n_i} = \Delta V_{sol}$$

$$\Delta G_{sol} = nRT \sum_i x_i \ln x_i$$

$$\Rightarrow \Delta V_{sol} = 0$$

Soluções ideais formam-se sem qualquer variação de volume